

(1) 骨粗鬆症治療剤：経口ビスホスホネート製剤

		第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
採用薬品名		【後】アレンドロン酸錠 35mg「ファイザー」	ベネット錠 17.5mg	ベネット錠 75mg
			第一選択薬が使用できない患者の場合（薬剤アレルギーや副作用等）	服薬アドヒアランス等から、月1回投与が望ましい患者の場合
一般名		アレンドロン酸 Na	リセドロン酸 Na	
薬価		167.70/錠	527.60/錠	2,317.30/錠
一月(30日)あたりの薬価		670.80	2,110.40	2,317.30
適応症		骨粗鬆症	骨粗鬆症 骨ページェット病	骨粗鬆症
用法		1回 35mg 1週間に1回	1回 17.5mg 1週間に1回 (骨粗鬆症に限る)	1回 75mg 月1回
禁忌	過敏症の既往歴	○	○	
	低カルシウム血症	○	○	
	食道狭窄又はアカラシア等の食道通過障害	○	○	
	服用時に立位・坐位を30分以上保てない患者	○	○	
	妊婦・妊娠の可能性		○	
	高度な腎障害		○	
ガイドライン	骨密度	A	A	
	椎体骨折	A	A	
	非椎体骨折	A	A	
	大腿骨近位部骨折	A	A	
	5αD ⁺ 性骨粗鬆症※	A	A	
<p>骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン（2015年版）薬物に関する有効性の評価と推奨度 【骨密度上昇効果】 A:上昇効果がある B:上昇するとの報告がある C:上昇するとの報告はない 【骨折発生抑制効果】 A:抑制する B:抑制するとの報告がある C:抑制するとの報告はない。 【※推奨度】 A:第一選択薬として推奨 B:第一選択薬が使用できないあるいは効果が不十分、早期不耐容 C:推奨するだけの有効性に関するデータが不足</p>				