

(2) 抗インフルエンザ薬

		第一選択薬	第二選択薬	第三選択薬
採用薬品名		【後】 オセルタミビル カプセル75mg 「サワイ」※	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラピアクタ点滴静注 液バッグ 300mg
			消化器症状等がある場合	内服・吸入困難な場合
一般名		オセルタミビルリン酸塩	ラニナミビルオクタン酸 エステル水和物	ペラミビル水和物
薬価		128.10/錠	2,179.50/キット	6,331.00/袋
一症例あたりの薬価 (成人 50kg、常用量)		1,281.00	4,359.00	6,331.00
適応症		A型またはB型インフルエンザウイルス感染症		
用法（成人）		1回 75mg、 1日 2回、 5日間内服	1回 40mg 単回吸入	1回 300mg 単回点滴静注
禁忌	過敏症の既往歴	○	○	○
有する患者 特定の背景を	乳製品に対する 過敏症の既往歴		注意	
	高度な腎障害	注意		注意
日本感染症学会 提言・指針	入院管理が必要 (生命の危険あり)	推奨	推奨しない	推奨
	入院管理が必要 (肺炎合併あり)	推奨		推奨
	入院管理が必要 (肺炎合併なし)	推奨	推奨	推奨
	外来治療が可能	推奨	推奨	
日本小児科学会 治療指針	新生児・乳児（生後 2週～1歳未満）	推奨	推奨しない	内服・吸入が困難な 場合
	幼児（1～4歳）	推奨	吸入困難	
	小児（5～9歳）	推奨	吸入可能な場合	
	10歳以上	推奨	推奨	
	呼吸器症状が強い・ 呼吸器疾患がある場合	推奨		
※新生児・乳児、幼児、小児、高齢者など、カプセル剤の嚥下が困難と判断される場合は、 適宜オセルタミビル <u>DS3%</u> 「サワイ」を選択する。				