

【ビタミン K2 シロップの予防投与についてのご案内(商品名:ケイツーシロップ)】

ケイツーシロップは、赤ちゃんのビタミンK不足による出血を予防するお薬です。
退院後から生後3か月まで、毎週1回1包を飲ませてください。

ケイツーシロップ投与スケジュール

- ・病院では入院中に2回(生後 24 時間と生後4~5 日目)内服しています。
- ・退院時に 11 回分のケイツーシロップをお渡しします。
- 退院後はご自宅で1週間ごとに内服させます。

あなたの赤ちゃんのケイツーシロップは

毎週

曜日に内服させましょう

こんな時は?の Q&A

Q:内服予定の日に、飲ませ忘れました!

A:気づいた時点で飲ませてください。

1~2日ずれても問題ありません。

Q:昼に飲ませたほうが良いですか?

A:時間帯はいつでも構いません。

哺乳の 20 分くらい前に飲ませると良いです。

Q:飲ませたけど、吐いてしまいました!こぼしてしまいました!

A:追加は不要です。また翌週に飲ませましょう。

Q:間違って2日間続けて飲ませてしまいました!

A:分かった時点から週に1回、曜日を決めて飲ませてください。



※11 本 880 円の代金を退院時の会計で請求させていただきます。あらかじめご了承ください。

